

Số: 69/BC-TTBVT

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng
Tuần 22 (Từ ngày 27/5/2024 – 02/6/2024)

I. Tình hình thời tiết và cây trồng

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác, nhiệt độ trung bình 21 – 28,6°C, cao nhất 32,2 – 37,5°C, thấp nhất 15 – 21°C; độ ẩm không khí 75 – 84%, lượng mưa 56–142mm; tổng số giờ nắng 38 – 49h.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích (ha)
Vụ Đông Xuân	Ngâm sữa - chín	2.272,3
	Thu hoạch	8.641,2
	Tổng	10.913,5
Vụ Hè Thu	Mạ	1.461
	Đẻ nhánh	1.540
	Đòng – trỗ	799
	Tổng	3.800

b) Cây trồng khác

Cây trồng	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích (ha)
Cây ngô (Vụ Hè Thu)	Cây con - PTTL	931,5
	Tổng	931,5
Cây cà phê	Nuôi quả	175.708
Cây điều	Chăm sóc	20.522
Cây tiêu	Chăm sóc	2.012,7
Dâu tằm	Chăm sóc – thu hoạch	10.251,7
Cây chè	Chăm sóc – thu hoạch	11.078,1
Cây sàu riêng	Nuôi trái	20.363,5
Cây cà chua	Trồng – thu hoạch	713
Rau họ thập tự	Trồng – thu hoạch	3.100
Hoa cúc	Trồng – thu hoạch	1.360

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Bộ trĩ gây hại 30ha lúa giai đoạn mạ tại Đạ Tẻh (tăng 30ha so với kỳ trước), TLH 10-13%.

- Ốc bươu vàng gây hại 13,5ha tại Đúc Trọng (tăng 13,5ha so với kỳ trước), mật độ 2,5-3 con/m².

- Các đối tượng khác như rầy nâu, bệnh đạo ôn, ngộ độc phèn... gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 36,4ha tại Đơn Dương, Đúc Trọng, Lạc Dương (tăng 7ha so với kỳ trước), mật độ 2,9 – 8 con/m².

3. Cây cà phê:

- Bộ xít muỗi gây hại 1.858ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt (tăng 15ha so với kỳ trước), TLH 17,6 – 29,9%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.313ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (tăng 137ha so với kỳ trước), TLH 15 – 20,6%.

- Bệnh khô cành gây hại 3.447ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (giảm 111,5ha so với kỳ trước), TLH 18 – 25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá ... chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bộ xít muỗi gây hại 3.391ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Di Linh (tăng 140ha so với kỳ trước), TLH 5 – 19,6%.

- Bệnh thối búp gây hại 200ha tại Bảo Lâm (giảm 20ha so với kỳ trước), TLH 5 – 5,1%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, ... chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bộ xít muỗi gây hại 3.338,3ha tại 3 huyện phía Nam (giảm 32ha so với kỳ trước), TLH 6,5 – 17,9%.

- Bệnh thán thư gây hại 3.648,1ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 67ha so với kỳ trước), TLH 7 – 18,1%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng gây hại 433ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (71ha nhiễm nặng), tăng 4,7ha so với kỳ trước, TLH 10 – 20%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh xì mù, vàng lá thối rễ biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 2.791,7ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (408,6ha nhiễm nặng), TLH 17,7 – 50%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoắn lá virus biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 47,6ha tại Đơn Dương, Đúc Trọng (3ha nhiễm nặng), TLH 7,8 – 23,3%.

- Bệnh mốc sương gây hại 27,9ha tại Đơn Dương, Đúc Trọng (tăng 9ha so với kỳ trước), TLH 6,7 – 16,6%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 540,8ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 19,9ha so với kỳ trước), mật độ từ 13 – 23con/m².

- Bệnh sung rễ gây hại 257,1ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Đà Lạt (giảm 8ha so với kỳ trước), TLH 3,9 – 7,4%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 14ha tại Đà Lạt, TLH 6,7 – 8,5%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,...sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. Dự báo SVGH và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa Hè Thu sớm giai đoạn làm đòng tại Lạc Dương. Bọ trĩ, OBV, ngọ độc phèn gây hại lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh tại Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đức Trọng.

- Cây cà phê: Rệp sáp, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành và bọ xít muỗi trên cà phê chè tiếp tục gây hại cà phê giai đoạn nuôi trái.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân cành gây hại rải rác.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mù, thối rữa có khả năng gia tăng mạnh khi thời tiết mưa nhiều. Ngoài ra chú ý nhện đỏ, rệp sáp, rầy xanh.

- Cây rau: Bệnh mốc sương, bệnh virus, thán thư, đốm lá, ruồi hại lá tiếp tục gây hại mạnh trên rau họ cà; Trên cây rau họ thập tự chú ý sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sung rễ, thối nhũn, thối hạch, bệnh cháy lá.

- Cây hoa: Bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá gây hại rải rác trên hoa cúc; trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng..

- Dâu tằm: Bệnh tuyến trùng tiếp tục gây hại tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai; rầy rệp, bọ phấn, nhện đỏ, rỉ sắt gây hại rải rác tại các huyện, thành phố.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Đề chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Thực hiện tốt biện pháp vệ sinh đồng ruộng, thu gom ốc và trứng OBV, làm đất kỹ, hướng dẫn nông dân sản xuất vụ Hè Thu đảm bảo lịch thời vụ, cơ cấu giống ưu tiên các giống lúa kháng rầy, đạo ôn. Chú ý phòng trừ bọ trĩ, OBV, bệnh đạo ôn, ngọ độc phèn trên lúa Hè Thu đã xuống giống. Tăng cường phòng chống dịch hại theo văn bản chỉ đạo số 1040/SNN-TTBVTV ngày 16/5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng về việc chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2024.

2.2. Cây sầu riêng

Thời tiết đã chuyển sang mùa mưa, tập trung phòng trừ bệnh xì mù, vàng lá thối rữa đang có xu hướng lây lan và gây hại mạnh. Khuyến cáo người dân thường xuyên

thăm vườn, khơi thông các bồn rãnh thoát nước khi có mưa lớn tránh đọng nước trên vườn và xung quanh gốc cây. Quét vôi quanh gốc ở độ cao từ 0,7 – 1m để hạn chế nấm bệnh lây lan từ đất lên cây. Đối với những cây vết bệnh đã thâm đen và chảy nhựa dùng dao cạo sạch, bôi dung dịch Ridomil Gold 68WG + Aliette 800WG lên vết bệnh. Ngoài ra kết hợp phun ướt đều quanh thân, lá và các nách cành từ 1-2 lần cách nhau 5-7 ngày bằng các loại thuốc trên. Tiêm thân đối với cây có đường kính > 15cm bằng thuốc Agrifos400 theo tỷ lệ 1:1.

2.3. Cây cà phê

Tập trung hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp tỉa cành, tạo tán, tỉa bỏ chồi vượt, cành tăm giúp vườn thông thoáng hạn chế bọ xít muỗi, nấm bệnh rỉ sắt, khô cành, vàng lá phát triển gây hại. Phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ, cân đối để hạn chế tình trạng rụng trái non.

2.4. Rau, hoa

Thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào rải rác. Chú ý phòng trừ các đối tượng như bọ trĩ, bọ phấn, ruồi đục lá, bệnh virus, mốc sương, thán thư trên rau họ cà; sâu tơ, bọ nhậy, sung rết, cháy lá trên rau họ thập tự; ruồi đục lá, bọ trĩ, bệnh virus trên hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng trên hoa hồng. Ngoài ra cần chủ động điều tra theo dõi sự xuất hiện của sâu đục lá cà chua Nam Mỹ (*Tuta absoluta*), ruồi đục trái/cà chua để kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng trừ.

2.5. Dâu tằm

Thời tiết đang chuyển sang mùa mưa, các địa phương cần chủ động theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ tuyến trùng gây hại. Có thể sử dụng các loại thuốc BVTV như: Tiêu tuyến trùng 18EC, Sincocin 0.56SL+ Agrispon 0.56SL, Tervigo 020SC, Stop 5SL, phòng trừ ở thời điểm ngay sau khi kết thúc các đợt thu hoạch lá để không ảnh hưởng đến tằm. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh rỉ sắt, phấn trắng, rầy rệp.

2.6 Cây điều

Hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc, tỉa cành, vệ sinh vườn, bón phân khi có mưa để vườn điều phục hồi sau thu hoạch. Tiếp tục theo dõi phòng trừ sâu đục thân cành, bọ xít muỗi, bệnh thán thư, khô cành./.

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;
- TTNN các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);
- Lưu: VT (Nh).

KT.CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Vũ Thị Thúy