

Số: 86/BC-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng
Tuần 25 (Từ ngày 17/6/2024 – 23/6/2024)

I. Tình hình thời tiết và cây trồng

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ trung bình 20,4 – 27,2⁰C, cao nhất 32 – 35,3⁰C, thấp nhất 16 – 19⁰C; độ ẩm không khí 81 – 89%, lượng mưa 24 – 116mm, tổng số giờ nắng 35 – 44h.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích (ha)
Vụ Đông Xuân	Ngâm sữa - chín	2.272,3
	Thu hoạch	8.641,2
	Tổng	10.913,5
Vụ Hè Thu	Mạ	688
	Đẻ nhánh	2.168
	Đòng – trỗ	1.476
	Tổng	4.332

b) Cây trồng khác

Cây trồng	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích (ha)
Cây ngô (Vụ Hè Thu)	Cây con - PTTL	2.805
	Tổng	2.805
Cây cà phê	Nuôi quả	175.708
Cây điều	Chăm sóc	20.338
Cây tiêu	Chăm sóc	2.012,7
Dâu tằm	Chăm sóc – thu hoạch	10.251,7
Cây chè	Chăm sóc – thu hoạch	11.078,1
Cây sầu riêng	Nuôi trái – thu hoạch	20.363,5
Cây cà chua	Trồng – thu hoạch	713
Rau họ thập tự	Trồng – thu hoạch	3.100
Hoa cúc	Trồng – thu hoạch	1.360

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Ốc bươu vàng gây hại 57,4ha tại Đức Trọng (tăng 30,1ha so với kỳ trước), mật độ 2,3-3 con/m².

- Bệnh đạo ôn lá gây hại 55ha lúa giai đoạn làm đòng tại Đạ Tẻh (tăng 55ha so với kỳ trước), TLH 6 – 7%.

- Các đối tượng khác như bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn cổ bông, ngộ độc phèn... gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 54,6ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương (2ha nhiễm nặng), tăng 9,3ha so với kỳ trước, mật độ 2,7 – 10 con/m².

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại 1.627ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, TLH 18,5 – 31,6%.

- Bệnh rỉ sắt ít biến động so với kỳ trước, gây hại nhẹ 3.386ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà, TLH 17 – 22,6%.

- Bệnh khô cành gây hại 3.212ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (giảm 150ha so với kỳ trước), TLH 18,7 – 25%.

- Một đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá ... chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại 2.950ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (giảm 201ha so với kỳ trước), TLH 5 – 19,3%.

- Bệnh thối búp gây hại 210ha tại Bảo Lâm (giảm 20ha so với kỳ trước), TLH 5,1 – 5,2%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, ... chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.113,3ha tại 3 huyện phía Nam (giảm 24ha so với kỳ trước), TLH 5 – 19,9%.

- Bệnh thán thư gây hại 3.283,3ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 29ha so với kỳ trước), TLH 6 – 17,3%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng gây hại 341ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh (giảm 10ha so với kỳ trước), TLH 10 – 17%.

7. Cây sầu riêng: Bệnh xì mù, vàng lá thối rễ biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 2.790,7ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (408,6ha nhiễm nặng), TLH 16,9 – 40%.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoắn lá virus gây hại 46ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 17,3ha so với kỳ trước), TLH 7,2 – 13,3%.

- Bệnh mốc sương gây hại 32ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 8,5ha so với kỳ trước), TLH 13,3 – 26,6%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 589,3ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 86,9ha so với kỳ trước), mật độ từ 13 – 26con/m².

- Bệnh sung rễ gây hại 259,4ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Đà Lạt (tăng 42,5ha so với kỳ trước), TLH 3,3 – 11,1%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 14ha tại Đà Lạt, TLH 8,7 – 10,5%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,... sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. Dự báo SVGH và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Chú ý phòng trừ bọ trĩ, OBV, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, ngộ độc phèn gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trổ tại Cát Tiên, Đa Tẻ, Đức Trọng, Lạc Dương.

- Cây cà phê: Rệp sáp, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành tiếp tục gây hại cà phê giai đoạn nuôi trái. Ngoài ra chú ý bọ xít muỗi gây hại cà phê chè.

- Cây điều: Thời tiết mưa nhiều, chú ý phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân cành trên các diện tích điều đang ra chồi lá non.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mù, thối rữa có khả năng gia tăng mạnh khi thời tiết mưa nhiều. Ngoài ra chú ý nhện đỏ, rệp sáp, rầy xanh.

- Cây rau: Bệnh mốc sương, bệnh virus, thán thư, đốm lá, ruồi hại lá tiếp tục gây hại mạnh trên rau họ cà; Trên cây rau họ thập tự chú ý sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sung rễ, thối nhũn, thối hạch, bệnh cháy lá.

- Cây hoa: Bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá gây hại rải rác trên hoa cúc; trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng..

- Dâu tằm: Bệnh tuyến trùng tiếp tục gây hại tại Đa Tẻ, Đa Huoai; rầy rệp, bọ phấn, nhện đỏ, rỉ sắt gây hại rải rác tại các huyện, thành phố.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Thực hiện tốt biện pháp vệ sinh đồng ruộng, thu gom ốc và trứng OBV, làm đất kỹ, hướng dẫn nông dân sản xuất vụ Hè Thu - Mùa đảm bảo lịch thời vụ, cơ cấu giống ưu tiên các giống lúa kháng rầy, đạo ôn. Chú ý phòng trừ bọ trĩ, OBV, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, ngộ độc phèn trên lúa Hè Thu đã xuống giống. Tăng cường chỉ đạo sản xuất và phòng chống dịch hại vụ Hè Thu – Mùa theo văn bản chỉ đạo số 1040/SNN-TTBVTV ngày 16/5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

2.2. Cây sầu riêng

Tập trung phòng trừ bệnh xì mù, vàng lá thối rữa. Khuyến cáo người dân thường xuyên thăm vườn, khơi thông các bồn rãnh thoát nước khi có mưa lớn tránh đọng nước trên vườn và xung quanh gốc cây, phòng trừ bệnh theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh *Phytophthora* hại sầu riêng do Cục BVTV hướng dẫn. Quét vôi quanh gốc ở độ cao từ 0,7 – 1m để hạn chế nấm bệnh lây lan từ đất lên cây. Đối với những cây vết bệnh đã thâm đen và chảy nhựa dùng dao cạo sạch, bôi dung dịch Ridomil Gold 68WG + Aliette 800WG hoặc Agrifos400 lên vết bệnh. Ngoài ra kết hợp tưới

gốc và phun ướt đều quanh thân, lá và các nách cành từ 1-2 lần cách nhau 5-7 ngày bằng các loại thuốc trên hoặc Acrobat MZ 90/600WG, Insuran 50WG. Tiêm thân đối với cây có đường kính > 15cm bằng thuốc Agrifos400 theo tỷ lệ 1:1. Trong thời gian cây đang nhiễm bệnh nặng hạn chế bón phân hóa học, phân bón lá.

2.3. Cây cà phê

Hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp tia cành, tạo tán, tia bỏ chồi vượt, cành tăm, cành sâu bệnh giúp vườn thông thoáng hạn chế bộ xít muối, nấm bệnh rỉ sắt, khô cành, vàng lá phát triển gây hại. Phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ, cân đối để hạn chế tình trạng rụng trái non. Chú ý phòng trừ rệp sáp, bệnh rỉ sắt, khô cành khô quả, bộ xít muối.

2.4. Rau, hoa

Thời tiết tiếp tục diễn biến theo chiều hướng ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào rải rác. Hướng dẫn bà con nông dân gieo trồng với mật độ phù hợp, lên luống cao, khơi thông mương rãnh thoát nước. Ngoài ra chú ý phòng trừ các đối tượng như bộ trĩ, bộ phấn, ruồi đục lá, bệnh virus, mốc sương, thán thư trên rau họ cà; sâu tơ, bộ nhảy, sung rể, cháy lá trên rau họ thập tự; ruồi đục lá, bộ trĩ, bệnh virus trên hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng trên hoa hồng. Ngoài ra cần chủ động điều tra theo dõi sự xuất hiện của sâu đục lá cà chua Nam Mỹ (*Tuta absoluta*), ruồi đục trái/cà chua để kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng trừ.

2.5. Dâu tằm

Thời tiết mưa nhiều, thuận lợi cho bệnh tuyến trùng lây lan gây hại, các địa phương cần chủ động theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ theo văn bản số 549/TTBVTV-BVTV ngày 11/8/2023 của Chi cục Trồng trọt & BVTV về việc bổ sung quy trình tạm thời phòng trừ tổng hợp bệnh tuyến trùng hại dâu tằm. Có thể sử dụng các loại thuốc BVTV như: Tiêu tuyến trùng 18EC, Sincocin 0.56SL + Agrispon 0.56SL, Tervigo 020SC, Stop 5SL, phòng trừ ở thời điểm ngay sau khi kết thúc các đợt thu hoạch lá để không ảnh hưởng đến tằm. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh rỉ sắt, phấn trắng, rầy rệp.

2.6 Cây điều

Thời tiết 3 huyện phía Nam hiện nay chủ yếu ngày nắng, có mưa rào nhẹ về chiều tối, cây điều tiếp tục ra chồi non rải rác rất thuận lợi cho bộ xít muối, sâu đục thân cành, bệnh thán thư lây lan và gây hại. Tuyên truyền, vận động nông dân tia cành, tạo tán, bón phân đợt 1, phát quang bụi rậm, làm sạch cỏ dại tạo cho vườn thông thoáng hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh. Tiếp tục theo dõi phòng trừ bộ xít muối, bệnh thán thư, khô cành, sâu đục thân cành./.

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;
- TTNN các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);
- Lưu: VT (Nh).

**KT.CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Vũ Thị Thúy