

Số: 100/BC TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng
Tuần 29 (Từ ngày 15/7/2024 – 21/7/2024)

I. Tình hình thời tiết và cây trồng

1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào nhiều nơi, nhiệt độ trung bình 19,4 – 23,9⁰C, cao nhất 25,6 – 30⁰C, thấp nhất 14,8 – 23,5⁰C; độ ẩm không khí 78 – 87%, lượng mưa 62,2 – 113,5mm, tổng số giờ nắng 43,8 – 68,2h.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích (ha)
Vụ Hè Thu	Mạ	1.065
	Đẻ nhánh	2.007
	Đòng – trỗ	1.507
	Ngậm sữa - chín	455
	Thu hoạch	550
	Tổng	5.584

b) Cây trồng khác

Cây trồng	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích (ha)
Cây ngô (Vụ Hè Thu)	Cây con – PTTL – Trỗ cờ	3.156
	Tổng	3.156
Cây cà phê	Nuôi quả	175.708
Cây điều	Chăm sóc	20.338
Cây tiêu	Chăm sóc	2.012,7
Dâu tằm	Chăm sóc – thu hoạch	10.251,7
Cây chè	Chăm sóc – thu hoạch	11.078,1
Cây sầu riêng	Thu hoạch	20.363,5
Cây cà chua	Trồng – thu hoạch	726
Rau họ thập tự	Trồng – thu hoạch	3.187
Hoa cúc	Trồng – thu hoạch	1.360

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Ốc bươu vàng gây hại 444,6ha tại Đức Trọng, Đơn Dương (giảm 2,5ha so với kỳ trước), mật độ 2-3 con/m².

- Bệnh đạo ôn lá gây hại 61ha lúa giai đoạn làm đòng tại Đạ Tẻh (tăng 4ha so với kỳ trước), TLH 8 – 9%.

- Các đối tượng khác như sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, ngộ độc phèn... gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 63,6ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương (tăng 12,1ha so với kỳ trước), mật độ 3 – 10 con/m².

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại 1.641ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt (giảm 202ha so với kỳ trước), TLH 16,4 – 32,4%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.419ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (tăng 125ha so với kỳ trước), TLH 20 – 25%.

- Bệnh khô cành gây hại 3.102ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (giảm 10ha so với kỳ trước), TLH 18,9 – 25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá ... chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại 2.750ha (giảm 300ha so với kỳ trước) tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, TLH 5 – 19,3%.

- Bệnh thối búp gây hại 170ha (giảm 10ha so với kỳ trước) tại Bảo Lâm, TLH 5 – 5,1%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, ... chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.038ha tại 3 huyện phía Nam (giảm 10ha so với kỳ trước), TLH 6,8 – 17,8%.

- Bệnh thán thư gây hại 3.181ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 9ha so với kỳ trước), TLH 5 – 18,2%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng ít biến động so với kỳ trước, gây hại nhẹ - trung bình 334,8ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, TLH 10 – 16,7%.

7. Cây sầu riêng:

- Bệnh xì mũ, vàng lá thối rễ biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 2.597,3ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (415,7ha nhiễm nặng), TLH 16,7 – 40%.

- Rệp sáp ít biến động so với kỳ trước, gây hại 623,6ha tại Đạ Huoai, TLH 6,1 – 7,1%.

- Mọt đục cành ít biến động so với kỳ trước, gây hại 1.039,3ha tại Đạ Huoai, TLH 8,1 – 12,5%.

- Các đối tượng khác như rầy các loại, nhện đỏ, bệnh thán thư, ... gây hại nhẹ rải rác.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoắn lá virus gây hại 43,1ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 7,5ha so với kỳ trước), TLH 9,6 – 26%.

- Bệnh mốc sương gây hại 42,5ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 10ha so với kỳ trước), TLH 21 – 26%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 429,2ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 37ha so với kỳ trước), mật độ từ 12 – 23con/m².

- Bệnh sung rễ gây hại 244,4ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Đà Lạt (giảm 17ha so với kỳ trước), TLH 3,3 – 10%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 14ha tại Đà Lạt, TLH 6,9 – 8,7%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,... sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. Dự báo SVGH và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: OBV có khả năng tiếp tục phát triển lây lan gây hại mạnh lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Ngoài ra chú ý bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô vằn, ngộ độc phèn.

- Cây cà phê: Rệp sáp, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành, bọ xít muỗi tiếp tục gây hại cà phê giai đoạn nuôi trái.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư gây hại rải rác trên các diện tích điều đang ra chồi lá non.

- Cây sầu riêng: Dự báo bệnh nứt thân xì mũ tiếp tục gây hại mạnh. Các đối tượng khác như rệp sáp, mọt đục cành, rầy các loại, bệnh thán thư ít biến động.

- Cây rau: Bệnh mốc sương, bệnh virus, thán thư, đốm lá, ruồi hại lá tiếp tục gây hại trên rau họ cà; Trên cây rau họ thập tự chú ý sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sung rễ, thối nhũn, thối hạch, bệnh cháy lá.

- Cây hoa: Bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá gây hại rải rác trên hoa cúc; trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng.

- Dâu tằm: Chú ý phòng trừ tuyến trùng trên các diện tích trồng thấp, thoát nước kém tại Đa Tẻh, Đa Huoai.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Các diện tích lúa Đông Xuân đã thu hoạch xong hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp làm đất, vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư thực vật, vùi lấp gốc rạ, cỏ dại, lúa chết, lúa cỏ nhằm tiêu diệt mầm mống sâu bệnh chuẩn bị xuống giống vụ Mùa. Tổ chức ra quân diệt chuột và thu lượm ốc brou vàng trước khi gieo sạ. Ngoài ra trên lúa vụ Hè Thu chú ý phòng trừ OBV, bệnh đạo ôn, khô vằn, ngộ độc phèn.

2.2. Cây sầu riêng

Tập trung phòng trừ bệnh xì mù, vàng lá thối rễ. Khuyến cáo người dân thường xuyên thăm vườn, khơi thông các bồn rãnh thoát nước khi có mưa lớn tránh đọng nước trên vườn và xung quanh gốc cây, theo dõi và phòng trừ bệnh theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh *Phytophthora* hại sầu riêng Cục BVTV đã hướng dẫn. Quét vôi quanh gốc ở độ cao từ 0,7 – 1m để hạn chế nấm bệnh lây lan từ đất lên cây. Đối với những cây vết bệnh đã thâm đen và chảy nhựa dùng dao cạo sạch, bôi dung dịch Ridomil Gold 68WG 20g/10 lít nước + Aliette 800WG 25g/10 lít nước hoặc Agrifos400 theo tỷ lệ 1:1 lên vết bệnh. Ngoài ra kết hợp tưới gốc và phun ướt đều quanh thân, lá và các nách cành từ 1-2 lần cách nhau 5-7 ngày bằng các loại thuốc trên hoặc Acrobat MZ 90/600WG, Insuran 50WG. Tiêm thân đối với cây có đường kính > 15cm bằng thuốc Agrifos400 theo tỷ lệ 1:1. Trong thời gian cây đang nhiễm bệnh nặng hạn chế bón phân hóa học, phân bón lá.

2.3. Cây cà phê

Cà phê đang giai đoạn nuôi trái, ra chồi lá non, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp tỉa cành, tạo tán, tỉa bỏ chồi vượt, cành tăm, cành sâu bệnh giúp vườn thông thoáng hạn chế bọ xít muỗi, nấm bệnh rỉ sắt, khô cành, vàng lá phát triển gây hại. Phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ, cân đối để hạn chế tình trạng rụng trái non. Chú ý phòng trừ rệp sáp, mọt đục quả, bệnh rỉ sắt, khô cành khô quả, bọ xít muỗi, vàng lá do tuyến trùng, nấm.

2.4. Rau, hoa

Hướng dẫn bà con nông dân gieo trồng với mật độ phù hợp, lên luống cao, khơi thông mương rãnh thoát nước tránh ngập úng cục bộ. Ngoài ra chú ý phòng trừ các đối tượng như bệnh virus, mốc sương, thán thư trên rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, sung rể, cháy lá trên rau họ thập tự; bọ trĩ, bệnh virus, rỉ sắt trên hoa cúc; bệnh đốm đen, bệnh phấn trắng trên hoa hồng. Ngoài ra cần chủ động điều tra theo dõi sự xuất hiện của sâu đục lá cà chua Nam Mỹ (*Tuta absoluta*), ruồi đục trái/cà chua để kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng trừ.

2.5. Dâu tằm

Thời tiết mưa nhiều, thuận lợi cho bệnh tuyến trùng lây lan gây hại, các địa phương cần chủ động theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ theo văn bản số 549/TTBVTV-BVTV ngày 11/8/2023 của Chi cục Trồng trọt & BVTV về việc bổ sung quy trình tạm thời phòng trừ tổng hợp bệnh tuyến trùng hại dâu tằm. Có thể sử dụng các loại thuốc BVTV như: Tiêu tuyến trùng 18EC, Sincocin 0.56SL + Agrispon 0.56SL, Tervigo 020SC, Stop 5SL, phòng trừ ở thời điểm ngay sau khi kết thúc các đợt thu hoạch lá để không ảnh hưởng đến tằm. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh rỉ sắt, phấn trắng, rầy rệp.

2.6 Cây điều

Tuyên truyền, vận động nông dân tỉa cành, tạo tán, bón phân, phát quang bụi rậm, làm sạch cỏ dại tạo cho vườn thông thoáng hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh. Tiếp tục theo dõi phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, khô cành, sâu đục thân cành./.

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;
- TTNN các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);
- Lưu: VT (Nh).

KT.CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Vũ Thị Thúy