

Số: 102/B – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng
Tuần 30 (Từ ngày 22/7/2024 – 28/7/2024)

I. Tình hình thời tiết và cây trồng

1. Thời tiết

Tuần qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 2, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ trung bình 19,1 – 25,8⁰C, cao nhất 28,3 – 32⁰C, thấp nhất 16,8 – 19,2⁰C; độ ẩm không khí 85 – 89%, lượng mưa 40,2 – 275,8mm, tổng số giờ nắng 8 – 14,8h.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích (ha)
Vụ Hè Thu	Mạ	320
	Đẻ nhánh	2.296
	Đòng – trỗ	1.708
	Ngậm sữa - chín	710
	Thu hoạch	550
	Tổng	5.584
Vụ Mùa	Mạ	4.635
	Tổng	4.635

b) Cây trồng khác

Cây trồng	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích (ha)
Cây ngô (Vụ Hè Thu)	PTTL – Đóng bắp	3.156
	Tổng	3.156
Cây cà phê	Nuôi quả	175.708
Cây điều	Chăm sóc	20.338
Cây tiêu	Chăm sóc	2.012,7
Dâu tằm	Chăm sóc – thu hoạch	10.251,7
Cây chè	Chăm sóc – thu hoạch	11.078,1
Cây sàu riêng	Thu hoạch	20.363,5
Cây cà chua	Trồng – thu hoạch	726

Rau họ thập tự	Trồng – thu hoạch	3.187
Hoa cúc	Trồng – thu hoạch	1.360

II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

1. Cây lúa:

- Ốc bươu vàng gây hại 350,4ha tại Đức Trọng, Đơn Dương (giảm 94,2ha so với kỳ trước), mật độ 2-3 con/m².

- Bệnh đạo ôn lá gây hại 88ha lúa giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái tại Đa Tềh, Đức Trọng (tăng 27ha so với kỳ trước), TLH 8 – 18,1%.

- Các đối tượng khác như bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, ngộ độc phèn... gây hại nhẹ rải rác.

2. Cây ngô: Sâu keo mùa thu gây hại 61,5ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương (giảm 2,1ha so với kỳ trước), mật độ 2 – 8 con/m².

3. Cây cà phê:

- Bọ xít muỗi gây hại 1.627ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt (giảm 14ha so với kỳ trước), TLH 18 – 32,6%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.419ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (giảm 25ha so với kỳ trước), TLH 20 – 22,7%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại 3.247ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (tăng 145ha so với kỳ trước), TLH 18,8 – 25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá ... chủ yếu gây hại nhẹ.

4. Cây chè:

- Bọ xít muỗi gây hại 2.500ha (giảm 250ha so với kỳ trước) tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, TLH 5 – 19,2%.

- Bệnh thối búp gây hại 180ha (tăng 10ha so với kỳ trước) tại Bảo Lâm, TLH 5 – 5,2%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, ... chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

5. Cây điều:

- Bọ xít muỗi gây hại 3.077ha tại 3 huyện phía Nam (tăng 39ha so với kỳ trước), TLH 5,8 – 17,9%.

- Bệnh thán thư gây hại 3.193ha tại Đa Huoai, Đa Tềh, Cát Tiên, Đam Rông (tăng 12ha so với kỳ trước), TLH 6,4 – 18,8%.

6. Cây dâu tằm: Tuyến trùng ít biến động so với kỳ trước, gây hại nhẹ - trung bình 334,8ha tại Đa Huoai, Đa Tềh, TLH 11,3 – 20%.

7. Cây sàu riêng:

- Bệnh xì mù, vàng lá thối rễ biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 2.599,2ha tại Đa Tềh, Đa Huoai, Cát Tiên (415,7ha nhiễm nặng), TLH 18,2 – 40%.

- Rệp sáp ít biến động so với kỳ trước, gây hại 623,6ha tại Đa Huoai, TLH 5,7 – 6,1%.

- Một đực cành ít biến động so với kỳ trước, gây hại 1.039,3ha tại Đạ Huoai, TLH 7,7 – 12%.

- Các đối tượng khác như rầy các loại, nhện đỏ, bệnh thán thư, ... gây hại nhẹ rải rác.

8. Cây rau, hoa:

Cà chua:

- Bệnh xoắn lá virus gây hại 45,2ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (3ha nhiễm nặng), tăng 2,1ha so với kỳ trước, TLH 9,6 – 26,7%.

- Bệnh mốc sương gây hại 49,5ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (1 ha nhiễm nặng), tăng 7ha so với kỳ trước, TLH 20 – 26,7%.

Rau họ thập tự:

- Sâu tơ gây hại 426,2ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 3ha so với kỳ trước), mật độ từ 12 – 24con/m².

- Bệnh sung rễ gây hại 239,4ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Đà Lạt (giảm 5ha so với kỳ trước), TLH 3,3 – 10%.

Hoa cúc: Bệnh sọc thân virus biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 15ha tại Đà Lạt, TLH 4,7 – 6,5%.

9. Cây trồng khác: Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,... sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

III. Dự báo SVGH và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

- Cây lúa: Thời tiết mưa nhiều, OBV có khả năng tiếp tục phát triển lây lan gây hại mạnh lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Ngoài ra chú ý bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, khô vằn, ngộ độc phèn.

- Cây cà phê: Bệnh rỉ sắt, thán thư, khô cành, khô quả, bọ xít muỗi/cà phê chèn có khả năng tăng mạnh trên cà phê giai đoạn nuôi trái do ảnh hưởng của mưa kéo dài.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư gây hại rải rác trên các diện tích điều đang ra chồi lá non.

- Cây sầu riêng: Dự báo bệnh nứt thân xì mũ, vàng lá thối rữa tiếp tục gây hại mạnh. Các đối tượng khác như rệp sáp, một đực cành, rầy các loại, bệnh thán thư ít biến động.

- Cây rau: Bệnh mốc sương, bệnh virus, thán thư, đốm lá, ruồi hại lá tiếp tục gây hại trên rau họ cà; Trên cây rau họ thập tự chú ý sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sung rễ, thối nhũn, thối hạch, bệnh cháy lá.

- Cây hoa: Bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá gây hại rải rác trên hoa cúc; trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng.

- Dâu tằm: Chú ý phòng trừ tuyến trùng trên các diện tích trứng thấp, thoát nước kém tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

2.1. Cây lúa

Do thời tiết mưa nhiều, ẩm độ không khí cao tạo môi trường thuận lợi cho nấm đạo ôn, khô vằn, OBV lây lan gây hại mạnh. Cần chủ động khuyến cáo nông dân phòng trừ sớm trên những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm bằng các thuốc BVTV đã đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam.

2.2. Cây sàu riêng

Tập trung phòng trừ bệnh xì mù, vàng lá thối rễ. Khuyến cáo người dân thường xuyên thăm vườn, khơi thông các bồn rãnh thoát nước khi có mưa lớn tránh đọng nước trên vườn và xung quanh gốc cây, theo dõi và phòng trừ bệnh theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh *Phytophthora* hại sàu riêng Cục BVTV đã hướng dẫn. Quét vôi quanh gốc ở độ cao từ 0,7 – 1m để hạn chế nấm bệnh lây lan từ đất lên cây. Hạn chế sử dụng phân bón vô cơ giai đoạn cây đang bị bệnh nặng, tăng cường bổ sung phân hữu cơ hoai mục kết hợp *Trichoderma sp*, *Paecilomyces sp*, nấm cộng sinh *Rhizomyx*. Đối với những cây vết bệnh đã thâm đen và chảy nhựa dùng dao cạo sạch, bôi dung dịch Ridomil Gold 68WG 20g/10 lít nước + Aliette 800WG 25g/10 lít nước hoặc Agrifos400 theo tỷ lệ 1:1 lên vết bệnh. Ngoài ra kết hợp tưới gốc và phun ướt đều quanh thân, lá và các nách cành từ 1-2 lần cách nhau 5-7 ngày bằng các loại thuốc trên hoặc Acrobat MZ 90/600WG, Insuran 50WG. Tiêm thân đối với cây có đường kính > 15cm bằng thuốc Agrifos400 theo tỷ lệ 1:1. Việc phòng trừ phải liên tục, thường xuyên cho đến khi kiểm soát được bệnh.

2.3. Cây cà phê

Cà phê đang giai đoạn nuôi trái, ra chồi lá non, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp tỉa cành, tạo tán, tỉa bỏ chồi vượt, cành tăm, cành sâu bệnh giúp vườn thông thoáng hạn chế bọ xít muỗi, nấm bệnh rỉ sắt, khô cành, vàng lá phát triển gây hại. Phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ, cân đối để hạn chế tình trạng rụng trái non. Chú ý phòng trừ rệp sáp, mọt đục quả, bệnh rỉ sắt, khô cành khô quả, bọ xít muỗi, vàng lá do tuyến trùng, nấm.

Đối với bệnh khô cành, khô quả, thán thư: khi phát hiện cây bị bệnh luân phiên sử dụng các hoạt chất như *Copper Hydroxide* (DuPont Kocide 46,1WG); *Mancozeb* (Dithane M-45 80WP); *Hexaconazole* (Tungvil 5SC); *Prochloraz* (Talent 50WP); *Azoxystrobin + Difenoconazole* (Amistar top 325SC); *Hexaconazole + Tricyclazole* (Forvilnew 250SC) để phòng trừ. Trong trường hợp mưa liên tục, phải phun kép từ 2 – 3 lần cách nhau 5- 7 ngày, khi phun thuốc phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng.

2.4. Rau, hoa

Hướng dẫn nông dân khơi thông hệ thống mương rãnh thoát nước để tránh ngập úng cục bộ, vệ sinh nhà kính để tăng cường độ ánh sáng hạn chế nấm bệnh. Ngoài ra chú ý phòng trừ các đối tượng như bệnh virus, mốc sương, thán thư, bọ phấn, ruồi đục lá trên rau họ cà; bệnh sung rẫy, cháy lá, sâu tơ, bọ nhảy trên rau họ

thập tự; ruồi đục lá, bọ trĩ, bệnh virus, rỉ sắt trên hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng, đốm đen trên hoa hồng.

Hiện nay, sâu đục lá cà chua Nam Mỹ đã xuất hiện trên vùng trồng cà chua tại huyện Đức Trọng, đề nghị TTNN các huyện có diện tích cà chua chủ động điều tra theo dõi sự xuất hiện của sâu đục lá cà chua Nam Mỹ (*Tuta absoluta*) để kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng trừ.

2.5. Dâu tằm

Thời tiết mưa nhiều, thuận lợi cho bệnh tuyến trùng lây lan gây hại, các địa phương cần chủ động theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ theo văn bản số 549/TTBVTV-BVTV ngày 11/8/2023 của Chi cục Trồng trọt & BVTV về việc bổ sung quy trình tạm thời phòng trừ tổng hợp bệnh tuyến trùng hại dâu tằm. Có thể sử dụng các loại thuốc BVTV như: Tiêu tuyến trùng 18EC, Sincocin 0.56SL + Agrispon 0.56SL, Tervigo 020SC, Stop 5SL, phòng trừ ở thời điểm ngay sau khi kết thúc các đợt thu hoạch lá để không ảnh hưởng đến tằm. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh rỉ sắt, phấn trắng, rầy rệp.

2.6 Cây điều

Tuyên truyền, vận động nông dân tỉa cành, tạo tán, bón phân, phát quang bụi rậm, làm sạch cỏ dại tạo cho vườn thông thoáng hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh. Tiếp tục theo dõi phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, khô cành, sâu đục thân cành./.

Nơi nhận:

- Trung tâm BVTV miền Trung;
- TTNN các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);
- Lưu: VT (Nh).

**KT.CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Vũ Thị Thúy