

Số: 170 /BC – TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 11 năm 2024

## BÁO CÁO

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng  
Tuần 48 (Từ ngày 25/11/2024 – 31/11/2024)

### I. Tình hình thời tiết và cây trồng

#### 1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào nhiều nơi, nhiệt độ trung bình 19,1 – 27,2<sup>0</sup>C, cao nhất 26,4 – 34<sup>0</sup>C, thấp nhất 13,1 – 21<sup>0</sup>C; độ ẩm không khí 77 – 79%, lượng mưa 0,2 – 23,2mm, tổng số giờ nắng 65,6 – 77,8h.

#### 2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

##### a) Cây lúa

Vụ	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích (ha)
Vụ Mùa	Đòng – trỗ	1.853
	Ngậm sữa - chín	2.211
	Thu hoạch	6.690,5
	<b>Tổng</b>	<b>10.754,5</b>
Vụ Đông Xuân 2024-2025	Mạ	2.065
	<b>Tổng</b>	<b>2.065</b>

##### b) Cây trồng khác

Cây trồng	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích (ha)
Cây ngô ( Vụ Mùa)	Cây con - Đóng bắp	1.785,7
	Thu hoạch	944
	<b>Tổng</b>	<b>2.729,7</b>
Cây cà phê	Nuôi quả - chín bói	174.529,8
Cây điều	Chăm sóc	19.757,6
Cây tiêu	Nuôi quả	2.159,8
Dâu tằm	Chăm sóc – thu hoạch	10.263,5
Cây chè	Chăm sóc – thu hoạch	9.754,5
Cây sầu riêng	Chăm sóc – thu hoạch	24.703,1
Cây cà chua	Trồng – thu hoạch	907
Rau họ thập tự	Trồng – thu hoạch	3.446
Hoa cúc	Trồng – thu hoạch	1.360

## **II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ**

### **1. Cây lúa:**

- Ngô độc phèn biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 78ha lúa tại Cát Tiên, Đạ Tẻh, TLH 12 – 14%.

- Bệnh đạo ôn cổ bông ít biến động so với kỳ trước, gây hại 41ha lúa tại Lạc Dương, Đạ Tẻh, TLH 3 – 4,3%.

- Bệnh khô vằn ít biến động so với kỳ trước, gây hại 58ha lúa tại Đạ Tẻh, TLH 18 – 25%.

- Các đối tượng khác như bệnh lem lép hạt, bệnh đạo ôn lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn,... gây hại nhẹ rải rác.

**2. Cây ngô:** Sâu keo mùa thu biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 29,1ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, mật độ 4 – 9 con/m<sup>2</sup>.

### **3. Cây cà phê:**

- Bọ xít muỗi ít biến động với kỳ trước, gây hại 1.794ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, TLH 16,2 – 25,3%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.376ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Lâm Hà (tăng 62ha so với kỳ trước), TLH 20,3 – 25%.

- Bệnh khô cành, khô quả gây hại 4.496ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (giảm 48ha so với kỳ trước), TLH 18 – 25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá ... chủ yếu gây hại nhẹ.

### **4. Cây chè:**

- Bọ xít muỗi gây hại 3.078ha (tăng 98ha so với kỳ trước) tại Bảo Lâm, Bảo Lộc, Di Linh, TLH 5 – 20,4%.

- Bệnh thối búp gây hại 138ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (giảm 11ha so với kỳ trước), TLH 5 – 5,2%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, ... chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

### **5. Cây điều:**

- Bọ xít muỗi biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 2.99,3 ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông, TLH 7 – 17,9%.

- Bệnh thán thư gây hại 2.919,6ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 3ha so với kỳ trước), TLH 7 – 25%.

**6. Cây dâu tằm:** Tuyến trùng gây hại nhẹ - trung bình 32,6ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, giảm 4,8ha so với kỳ trước, TLH 11 – 30%.

### **7. Cây sầu riêng:**

- Bệnh xì mù, vàng lá thối rễ gây hại 2.017,9 ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (212,3ha nhiễm nặng), tăng 4ha so với kỳ trước, TLH 8 – 40%.

- Mọt đục cành ít biến động so với kỳ trước, gây hại 1.273,9ha tại Đạ Huoai, TLH 6,9 – 14,3%.

- Các đối tượng khác như rầy các loại, nhện đỏ, bệnh thán thư, ... gây hại nhẹ rải rác.

**8. Cây hồng ăn trái:** Rệp sáp ít biến động so với kỳ trước, gây hại 9,6ha giai đoạn thu hoạch tại huyện Đơn Dương (3ha nhiễm nặng), TLH 37,5 - 51% cây.

### **9. Cây rau, hoa:**

#### ***Cà chua:***

- Bệnh xoắn lá virus gây hại 131,8ha tại Đơn Dương, Đức Trọng (15,7ha nhiễm nặng), tăng 3,4ha so với kỳ trước, TLH 15,7 – 33,3%.

- Bệnh mốc sương gây hại 37,4ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, giảm 5ha so với kỳ trước, TLH 15 – 16,6%.

#### ***Rau họ thập tự:***

- Sâu tơ gây hại 379,2ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (giảm 3ha so với kỳ trước), mật độ từ 6 – 23con/m<sup>2</sup>.

- Bệnh sưng rễ gây hại 203,2ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Đà Lạt, giảm 25,4ha so với kỳ trước, TLH 3,3 – 6,7%.

***Hoa cúc:*** Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 15ha tại Đà Lạt, TLH 3,9 – 5,7%.

**10. Cây trồng khác:** Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,... sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

### **III. Dự báo SVGH và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ**

#### **1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới**

- Cây lúa: Bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông, ngộ độc phèn, khô vằn tiếp tục gây hại lúa Mùa giai đoạn đẻ nhánh – ngậm sữa.

- Cây cà phê: Bệnh khô cành, khô quả, rỉ sắt, rệp sáp tiếp tục gây hại cà phê giai đoạn chuẩn bị thu hoạch.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư có khả năng tăng nhẹ trên cây điều giai đoạn ra chồi, lá non.

- Cây sầu riêng: Chú ý phòng trừ bệnh nứt thân xì mũ, vàng lá thối rễ, thán thư, rệp sáp, một đực cành, rầy các loại,...

- Cây rau: Bệnh mốc sương, héo xanh, virus, thán thư, đốm lá, ruồi hại lá, sâu đục lá cà chua Nam Mỹ tiếp tục gây hại trên rau họ cà; trên cây rau họ thập tự chú ý sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sưng rễ, thối nhũn, thối hạch, bệnh cháy lá.

- Cây hoa: Bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá gây hại rải rác trên hoa cúc; trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng.

- Dâu tằm: Bệnh tuyến trùng tiếp tục gây hại tại huyện Đa Huoai, Đa Tẻ đặc biệt tại các vùng trũng thấp, bị ngập úng.

#### **2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới**

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

## 2.1. Cây lúa

Hiện nay các địa phương đang xuống giống vụ Đông Xuân sớm. Hướng dẫn nông dân xuống giống tập trung thực hiện tốt biện pháp vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo sạ để hạn chế lây lan mầm bệnh từ vụ trước đặc biệt ốc brou vàng, bệnh đạo ôn, triển khai một số nhiệm vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2024-2025 theo văn bản số 2940/SNN-TTBVTV ngày 20/11/2024 của Sở Nông nghiệp & PTNT. Đối với lúa Mùa giai đoạn đồng – trổ chín chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt để đảm bảo năng suất thu hoạch.

## 2.2. Cây sầu riêng

Chú ý theo dõi phòng trừ bệnh nứt thân xì mù theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh *Phytophthora* hại sầu riêng Cục BVTV đã hướng dẫn. Quét vôi quanh gốc ở độ cao từ 0,7 – 1m để hạn chế nấm bệnh lây lan từ đất lên cây. Hạn chế sử dụng phân bón vô cơ giai đoạn cây đang bị bệnh nặng, tăng cường bổ sung phân hữu cơ hoai mục kết hợp *Trichoderma sp*, *Paecilomyces sp*, nấm cộng sinh *Rhizomyx*. Đối với những cây vết bệnh đã thâm đen và chảy nhựa dùng dao cạo sạch, bôi dung dịch Ridomil Gold 68WG 20g/10 lít nước + Aliette 800WG 25g/10 lít nước hoặc Agrifos400 theo tỷ lệ 1:1 lên vết bệnh. Ngoài ra kết hợp tưới gốc và phun ướt đều quanh thân, lá và các nách cành từ 1-2 lần cách nhau 5-7 ngày bằng các loại thuốc trên hoặc Acrobat MZ 90/600WG, Insuran 50WG. Tiêm thân đối với cây có đường kính > 15cm bằng thuốc Agrifos400 theo tỷ lệ 1:1. Việc phòng trừ phải liên tục, thường xuyên cho đến khi kiểm soát được bệnh.

## 2.3. Cây cà phê

Hướng dẫn nông dân hạn chế sử dụng thuốc BVTV để quản lý sâu bệnh ở giai đoạn thu hoạch, bảo quản và chăm sóc cây cà phê sau thu hoạch niên vụ năm 2024-2025 theo văn bản số 2635/SNN-TTBVTV ngày 24/10/2024 của Sở Nông nghiệp & PTNT.

## 2.4. Rau, hoa

- Hướng dẫn nông dân chủ động thăm vườn để phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, chú ý phòng trừ các loại bệnh lây lan mạnh trong điều kiện mùa mưa như mốc sương, đốm lá, virus/ rau họ cà; bệnh cháy lá, sưng rễ, thối nhũn/ rau họ thập tự; bệnh rỉ sắt/ hoa cúc; bệnh đốm đen, phấn trắng/ hoa hồng.

- Tiếp tục chủ động điều tra theo dõi, hướng dẫn biện pháp phòng trừ sâu đục lá cà chua Nam Mỹ (*Tuta absoluta*) theo văn bản số 303/TTBVTV ngày 25/7/2024 của Chi cục Trồng trọt & BVTV về việc tổ chức điều tra, báo cáo, triển khai phòng chống sâu đục lá cà chua Nam Mỹ.

## 2.5. Dâu tằm

Bệnh tuyến trùng tiếp tục gây hại tại huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh trên những diện tích trồng thấp bị ngập úng, các địa phương cần chủ động theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ theo văn bản số 549/TTBVTV-BVTV ngày 11/8/2023 của Chi cục Trồng trọt & BVTV về việc bổ sung quy trình tạm thời phòng trừ tổng hợp bệnh tuyến trùng hại dâu tằm. Có thể sử dụng các loại thuốc BVTV như: Tiêu tuyến trùng 18EC, Sincocin 0.56SL + Agrispon 0.56SL, Tervigo 020SC, Stop 5SL, phòng trừ ở thời điểm ngay sau khi kết thúc các đợt thu hoạch lá để không ảnh hưởng đến tằm.

## **2.6 Cây điều**

Tuyên truyền, vận động nông dân tỉa cành, tạo tán, bón phân, phát quang bụi rậm, làm sạch cỏ dại tạo cho vườn thông thoáng hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh. Tiếp tục theo dõi phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, khô cành, sâu đục thân cành

## **2.7 Cây hồng ăn trái**

Các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình gây hại của rệp sáp và hướng dẫn phòng trừ kịp thời theo văn bản số 452/TTBVTV ngày 03/10/2024 của Chi cục Trồng trọt & BVTV./.

### ***Nơi nhận:***

- Trung tâm BVTV miền Trung;
- TTNN các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);
- Lưu: VT (Na).

**KT.CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Vũ Thị Thúy**