

Số: 283/TTBVTV-BVTV

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 5 năm 2023

V/v tăng cường phòng chống hiện tượng rụng hoa, rụng trái non sâu riềng trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Kính gửi: Phòng Kinh tế, phòng Nông nghiệp & PTNT, TTNN các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Lâm Hà, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, thành phố Bảo Lộc.

Sâu riềng là cây ăn quả chủ lực của tỉnh. Tại 3 huyện phía Nam, phần lớn diện tích sâu riềng hiện nay đang trong giai đoạn phát triển trái, dự kiến thu hoạch từ giữa tháng 7/2023, khu vực các huyện Di Linh, Bảo Lâm và TP Bảo Lộc do đặc điểm thời tiết khí hậu nên sâu riềng ra hoa muộn hơn, hiện nay chủ yếu đang trong giai đoạn nuôi hoa, xả nhị và đậu trái non.

Thời tiết trong những ngày gần đây khu vực thành phố Bảo Lộc và các vùng phụ cận chủ yếu ngày nắng nóng liên tục, chiều có mưa lớn đã làm cho cây sâu riềng bị sốc nhiệt, sốc nước gây rụng hoa và trái non, tỷ lệ rụng phổ biến ở các vườn từ 20 -30%. Để chủ động chăm sóc và phòng chống hiện tượng rụng hoa, trái non khi gặp thời tiết bất lợi, Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng đề nghị Phòng Nông nghiệp & PTNT, TTNN các huyện chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật sau:

1. Giai đoạn sâu riềng ra hoa, đậu trái nếu thời tiết nắng nóng phải chủ động tưới nước cho cây đều đặn vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, tưới đủ ẩm, không tưới quá nhiều giúp cây hạn chế tình trạng sốc nhiệt vào buổi trưa khi nhiệt độ tăng cao đồng thời hạn chế hiện tượng sốc nước đột ngột khi gặp mưa lớn gây rụng hoa, rụng trái.

2. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các yếu tố dinh dưỡng đa, trung vi lượng cho cây sâu riềng phù hợp với từng giai đoạn sâu riềng nuôi hoa, xả nhị, phát triển trái để tăng sức chống chịu khi gặp điều kiện thời tiết bất lợi. Giai đoạn trước khi sâu riềng xả nhị, ngoài phân đa lượng có hàm lượng P,K cao, cần bổ sung các loại phân bón lá có chứa Canxi, Bo để tăng khả năng thụ phấn, giảm rụng bông và trái non; sau khi sâu riềng đậu quả từ 15 -20 ngày, tiếp tục bổ sung Bo để hạn chế hiện tượng cháy múi.

3. Giai đoạn cây xả nhị, đậu trái non gặp thời tiết mưa nhiều, cây ra đợt non mạnh cũng gây rụng hoa, rụng trái, cần sử dụng một số loại phân bón lá có hàm lượng kali cao như MKP (0:52:34) hoặc KNO₃ để chặn đợt non, giúp hoa thụ phấn, đậu quả tốt. Duy trì phun định kỳ 7- 10 ngày/lần các loại phân bón lá trên ở giai đoạn nuôi trái (3-12 tuần sau đậu quả) để hãm đợt non và hạn chế rụng trái.

4. Thường xuyên thăm vườn sầu riêng nhất là lúc thời tiết nắng mưa thất thường hoặc mưa nhiều để phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh như rệp sáp, rầy xanh, rầy bông, nhện đỏ, bệnh nứt thân xì mũ, thối rễ, thối trái. Thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, phát dọn cỏ dại, tỉa cành tạo tán, tỉa bỏ các thân, cành lá, quả bị sâu bệnh gây hại nặng, những trái kém phát triển giúp cho vườn thông thoáng. Khơi thông hệ thống mương rãnh thoát nước, phá bồn để tránh vườn bị đọng nước, ngập úng trong mùa mưa gây thối rễ, sượng trái tạo điều kiện cho bệnh xì mũ gây hại nặng có thể dẫn đến chết cây. Khi cần thiết sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên sầu riêng và đảm bảo thời gian cách ly để tránh tồn dư dư lượng thuốc BVTV trong sản phẩm.

Đề nghị các địa phương quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện để bảo vệ tốt năng suất sầu riêng niên vụ 2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN&PTNT;
- Lưu: VT, BVTV.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Trần Quang Duy