

Số: 89/BC-TTBVTV

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 6 năm 2024

## BÁO CÁO

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng  
Tuần 26 (Từ ngày 24/6/2024 – 30/6/2024)

### I. Tình hình thời tiết và cây trồng

#### 1. Thời tiết

Tuần qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ trung bình 21 – 28<sup>0</sup>C, cao nhất 31,4 – 34,5<sup>0</sup>C, thấp nhất 15,6 – 19<sup>0</sup>C; độ ẩm không khí 78 – 86%, lượng mưa 39,1 – 139,4mm, tổng số giờ nắng 49,3 – 55,9h.

#### 2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

##### a) Cây lúa

Vụ	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích (ha)
Vụ Đông Xuân	Thu hoạch xong	10.913,5
Vụ Hè Thu	Mạ	1.075
	Đẻ nhánh	2.424
	Đòng – trỗ	1.765
	Ngậm sữa - chín	154
	<b>Tổng</b>	<b>5.418</b>

##### b) Cây trồng khác

Cây trồng	Giai đoạn sinh trưởng	Diện tích (ha)
Cây ngô ( Vụ Hè Thu)	Cây con – PTTL – trỗ cò	3.065
	<b>Tổng</b>	<b>3.065</b>
Cây cà phê	Nuôi quả	175.708
Cây điều	Chăm sóc	20.338
Cây tiêu	Chăm sóc	2.012,7
Dâu tằm	Chăm sóc – thu hoạch	10.251,7
Cây chè	Chăm sóc – thu hoạch	11.078,1
Cây sầu riêng	Nuôi trái – thu hoạch	20.363,5
Cây cà chua	Trồng – thu hoạch	713
Rau họ thập tự	Trồng – thu hoạch	3.100
Hoa cúc	Trồng – thu hoạch	1.360

## **II. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ**

### **1. Cây lúa:**

- Ốc bươu vàng gây hại 112ha tại Đức Trọng (tăng 54,6ha so với kỳ trước), mật độ 2-3 con/m<sup>2</sup>.

- Bệnh đạo ôn lá gây hại 63ha lúa giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái tại Đạ Tẻh (tăng 8ha so với kỳ trước), TLH 8 – 9%.

- Các đối tượng khác như bọ trĩ, bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, ngộ độc phèn... gây hại nhẹ rải rác.

**2. Cây ngô:** Sâu keo mùa thu gây hại 62,6ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương (tăng 8ha so với kỳ trước), mật độ 2 – 6 con/m<sup>2</sup>.

### **3. Cây cà phê:**

- Bọ xít muỗi ít biến động so với kỳ trước, gây hại 1.627ha cà phê chè tại Lạc Dương, Đà Lạt, TLH 15,3 – 31,9%.

- Bệnh rỉ sắt gây hại nhẹ 3.450ha tại Lạc Dương, Đam Rông, Bảo Lâm, TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà (tăng 64ha so với kỳ trước), TLH 17 – 22,8%.

- Bệnh khô cành gây hại 3.247ha tại hầu hết các huyện trồng cà phê (tăng 35ha so với kỳ trước), TLH 18 – 25%.

- Mọt đục cành, rệp các loại, bệnh nấm hồng, vàng lá ... chủ yếu gây hại nhẹ.

### **4. Cây chè:**

- Bọ xít muỗi gây hại 3.150ha tại Bảo Lâm, Bảo Lộc (tăng 200ha so với kỳ trước), TLH 5 – 19,4%.

- Bệnh thối búp ít biến động so với kỳ trước, gây hại 210ha tại Bảo Lâm, TLH 5,1 – 5,2%.

- Các đối tượng: rầy xanh, bọ cánh tơ, ... chủ yếu gây hại ở mức nhẹ.

### **5. Cây điều:**

- Bọ xít muỗi gây hại 3.123,3ha tại 3 huyện phía Nam (tăng 10ha so với kỳ trước), TLH 5 – 18,3%.

- Bệnh thán thư gây hại 3.151,5ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông (giảm 131,8ha so với kỳ trước), TLH 5 – 18,8%.

**6. Cây dâu tằm:** Tuyến trùng biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại nhẹ - trung bình 341,1ha tại Đạ Huoai, Đạ Tẻh, TLH 10 – 17%.

### **7. Cây sầu riêng:**

- Bệnh xì mũ, vàng lá thối rễ gây hại 2.576,5ha tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên (612,9ha nhiễm nặng), giảm 214,2ha so với kỳ trước, TLH 18,3 – 40%.

- Rệp sáp ít biến động so với kỳ trước, gây hại 1.225,7ha tại Đạ Huoai, TLH 7,1 – 10,5%.

- Mọt đục cành gây hại 1.075,4ha tại Đạ Huoai (tăng 54ha so với kỳ trước), TLH 8,2 – 13,6%.

- Các đối tượng khác như rầy các loại, nhện đỏ, bệnh thán thư, ... gây hại nhẹ rải rác.

## **8. Cây rau, hoa:**

### ***Cà chua:***

- Bệnh xoắn lá virus biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 48ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, TLH 6,6 – 16,7%.

- Bệnh mốc sương biến động nhẹ so với kỳ trước, gây hại 33ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, TLH 6,7 – 26,6%.

### ***Rau họ thập tự:***

- Sâu tơ gây hại 599,5ha tại Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng (tăng 10,2ha so với kỳ trước), mật độ từ 12 – 28con/m<sup>2</sup>.

- Bệnh sung rễ gây hại 241,5ha tại Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Đà Lạt (giảm 17,9ha so với kỳ trước), TLH 3,3 – 9,6%.

***Hoa cúc:*** Bệnh sọc thân virus ít biến động so với kỳ trước, gây hại 14ha tại Đà Lạt, TLH 7,6 – 9,4%.

**9. Cây trồng khác:** Cây cao su, chanh leo, cà rốt, dâu tây, hoa hồng,... sâu bệnh chủ yếu gây hại nhẹ.

## **III. Dự báo SVGH và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ**

### **1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới**

- Cây lúa: Bọ trĩ, OBV, bệnh đạo ôn lá, khô vằn, ngộ độc phèn gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng. Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa giai đoạn ngâm sữa - chín.

- Cây cà phê: Rệp sáp, bệnh rỉ sắt, vàng lá, khô cành tiếp tục gây hại cà phê giai đoạn nuôi trái. Ngoài ra chú ý bọ xít muỗi gây hại cà phê chè.

- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân cành tiếp tục gây hại trên các diện tích điều đang ra chồi lá non.

- Cây sầu riêng: Bệnh xì mũ, thối rữa có khả năng gia tăng mạnh khi thời tiết mưa nhiều. Ngoài ra chú ý một đục cành, rệp sáp, rầy các loại.

- Cây rau: Bệnh mốc sương, virus, thán thư, đốm lá, ruồi hại lá tiếp tục gây hại mạnh trên rau họ cà; Trên cây rau họ thập tự chú ý sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sung rễ, thối nhũn, thối hạch, bệnh cháy lá.

- Cây hoa: Bệnh rỉ sắt, virus sọc thân, ruồi hại lá gây hại rải rác trên hoa cúc; trên hoa hồng chú ý nhện đỏ, bệnh đốm đen, phấn trắng.

- Dâu tằm: Bệnh tuyến trùng tiếp tục gây hại tại Đa Tẻ, Đa Huoai; rầy rệp, bệnh phấn trắng, rỉ sắt gây hại rải rác tại các huyện, thành phố.

### **2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới**

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh. Đề nghị TTNN các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện một số biện pháp kỹ thuật sau:

## 2.1. Cây lúa

Tăng cường chỉ đạo sản xuất và phòng chống dịch hại vụ Hè Thu – Mùa theo văn bản chỉ đạo số 1040/SNN-TTBVTV ngày 16/5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng. Chú ý phòng trừ bọ trĩ, OBV, bệnh đạo ôn, khô vằn, ngộ độc phèn.

## 2.2. Cây sầu riêng

Tập trung phòng trừ bệnh xì mù, vàng lá thối rễ. Khuyến cáo người dân thường xuyên thăm vườn, khơi thông các bồn rãnh thoát nước khi có mưa lớn tránh đọng nước trên vườn và xung quanh gốc cây, theo dõi và phòng trừ bệnh theo quy trình kỹ thuật quản lý bệnh *Phytophthora* hại sầu riêng Cục BVTV đã hướng dẫn. Quét vôi quanh gốc ở độ cao từ 0,7 – 1m để hạn chế nấm bệnh lây lan từ đất lên cây. Đối với những cây vết bệnh đã thâm đen và chảy nhựa dùng dao cạo sạch, bôi dung dịch Ridomil Gold 68WG 20g/10 lít nước + Aliette 800WG 25g/10 lít nước hoặc Agrifos400 theo tỷ lệ 1:1 lên vết bệnh. Ngoài ra kết hợp tưới gốc và phun ướt đều quanh thân, lá và các nách cành từ 1-2 lần cách nhau 5-7 ngày bằng các loại thuốc trên hoặc Acrobat MZ 90/600WG, Insuran 50WG. Tiêm thân đối với cây có đường kính > 15cm bằng thuốc Agrifos400 theo tỷ lệ 1:1. Trong thời gian cây đang nhiễm bệnh nặng hạn chế bón phân hóa học, phân bón lá.

## 2.3. Cây cà phê

Cà phê đang giai đoạn nuôi trái, ra chồi lá non, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp tỉa cành, tạo tán, tỉa bỏ chồi vượt, cành tăm, cành sâu bệnh giúp vườn thông thoáng hạn chế bọ xít muỗi, nấm bệnh rỉ sắt, khô cành, vàng lá phát triển gây hại. Phát dọn cỏ dại, bón phân đầy đủ, cân đối để hạn chế tình trạng rụng trái non. Chú ý phòng trừ rệp sáp, mọt đục quả, bệnh rỉ sắt, khô cành khô quả, bọ xít muỗi.

## 2.4. Rau, hoa

Hướng dẫn bà con nông dân gieo trồng với mật độ phù hợp, lên luống cao, khơi thông mương rãnh thoát nước tránh ngập úng cục bộ. Ngoài ra chú ý phòng trừ các đối tượng như bọ trĩ, bọ phấn, ruồi đục lá, bệnh virus, mốc sương, thán thư trên rau họ cà; sâu tơ, bọ nhảy, sung rế, cháy lá trên rau họ thập tự; ruồi đục lá, bọ trĩ, bệnh virus trên hoa cúc; nhện đỏ, bệnh phấn trắng trên hoa hồng. Ngoài ra cần chủ động điều tra theo dõi sự xuất hiện của sâu đục lá cà chua Nam Mỹ (*Tuta absoluta*), ruồi đục trái/cà chua để kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng trừ.

## 2.5. Dâu tằm

Thời tiết mưa nhiều, thuận lợi cho bệnh tuyến trùng lây lan gây hại, các địa phương cần chủ động theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ theo văn bản số 549/TTBVTV-BVTV ngày 11/8/2023 của Chi cục Trồng trọt & BVTV về việc bổ sung quy trình tạm thời phòng trừ tổng hợp bệnh tuyến trùng hại dâu tằm. Có thể sử dụng các loại thuốc BVTV như: Tiêu tuyến trùng 18EC, Sincocin 0.56SL + Agrispon 0.56SL, Tervigo 020SC, Stop 5SL, phòng trừ ở thời điểm ngay sau khi kết thúc các đợt thu hoạch lá để không ảnh hưởng đến tằm. Ngoài ra chú ý phòng trừ bệnh rỉ sắt, phấn trắng, rầy rệp.

## 2.6 Cây điều

Cây điều tiếp tục ra chồi non rải rác rất thuận lợi cho bọ xít muỗi, sâu đục thân cành, bệnh thán thư lây lan và gây hại. Tuyên truyền, vận động nông dân tỉa cành, tạo tán, bón phân, phát quang bụi rậm, làm sạch cỏ dại tạo cho vườn thông thoáng hạn chế nơi cư trú của sâu bệnh. Tiếp tục theo dõi phòng trừ bọ xít muỗi, bệnh thán thư, khô cành, sâu đục thân cành./.

### ***Nơi nhận:***

- Trung tâm BVTV miền Trung;
- TTNN các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Chi cục TT&BVTV (B/c);
- Lưu: VT (Nh).

**KT.CHI CỤC TRƯỞNG**  
**PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

**Vũ Thị Thúy**